

JOURNÉE MONDIALE
DE LUTTE CONTRE
LE SIDA
2015

Le sida en chiffres 2015



35%

diminution des nouvelles infections
à VIH depuis 2000



42%

diminution des décès liés au sida
depuis le pic de 2004



58%

diminution des nouvelles infections
à VIH parmi les enfants depuis 2000



84%

augmentation de l'accès à la thérapie
antirétrovirale depuis 2010

Le monde a enrayé et inversé la propagation du VIH. L'épidémie a été contrainte de reculer. Les nouvelles infections à VIH et les décès liés au sida ont considérablement chuté depuis le pic de l'épidémie. Maintenant la riposte franchit une étape de plus – mettre fin à l'épidémie de sida d'ici à 2030.

15,8

**millions de
personnes
vivant avec le
VIH avaient
accès à la
thérapie
antirétrovirale
en juin 2015.**

15,8 millions sous traitement

En 2014, 36,9 millions de personnes vivaient avec le VIH. Le nombre des personnes vivant avec le VIH continue d'augmenter, en grande partie du fait que davantage de personnes dans le monde ont accès à la thérapie antirétrovirale et vivent ainsi plus longtemps, et en meilleure santé. En juin 2015, 15,8 millions de personnes avaient accès au traitement. Parallèlement, bien que les nouvelles infections à VIH aient diminué, un nombre inacceptablement élevé de nouvelles infections à VIH et de décès liés au sida surviennent encore chaque année. En 2014, environ 2 millions de personnes ont été nouvellement infectées par le VIH et 1,2 million de personnes sont décédées de maladies liées au sida.

Des objectifs du Millénaire pour le développement aux objectifs de développement durable

Le monde a dépassé les cibles relatives au sida du sixième objectif du Millénaire pour le développement (OMD), soit enrayer et inverser la propagation du VIH, et de plus en plus de pays sont sur la voie de l'accélération visant à mettre fin à l'épidémie de sida d'ici à 2030 dans le cadre des objectifs de développement durable (ODD).

Les nouvelles infections à VIH ont chuté de 35% depuis 2000 (de 58% parmi les enfants) et les décès liés au sida ont baissé de 42% depuis le pic de 2004. La riposte mondiale au VIH a évité 30 millions de nouvelles infections à VIH et près de 8 millions (7,8 millions) de décès liés au sida depuis 2000, lorsque les OMD ont été établis.

Assurer l'accès à la thérapie antirétrovirale pour 15,8 millions de personnes est une réalisation jugée impossible il y a 15 ans. En 2000, moins de 1% des personnes vivant avec le VIH dans les pays à revenu faible ou intermédiaire avaient accès au traitement. En 2014, la couverture mondiale des personnes bénéficiant d'une thérapie antirétrovirale était de 40%.

Mais le VIH continue de jeter un éclairage violent sur les inégalités dans le monde. Le sida est un processus inachevé.

Le besoin de changement est incontestable et impératif. Les lacunes et les défaillances significatives de la riposte doivent être rectifiées. Accélérer la riposte au sida dans les pays à revenu faible ou intermédiaire pourrait éviter 28 millions de nouvelles infections à VIH et 21 millions de décès liés au sida entre 2015 et 2030, économisant US\$ 24 milliards par an de coûts de traitement supplémentaires pour le VIH.

La phase suivante de la riposte au sida doit prendre en compte les nouvelles réalités, opportunités et données probantes, notamment un contexte qui évolue rapidement et un nouveau programme de développement durable. La riposte au sida a une priorité unique pour les 15 années à venir : mettre fin à l'épidémie d'ici à 2030.

Les résultats à obtenir sur la voie de l'accélération

Une intensification rapide des approches essentielles de prévention et de traitement du VIH permettront à la riposte de devancer l'épidémie.

IMPORTANTES AVANTAGES :

21 MILLIONS

de décès liés au sida évités d'ici à 2030

28 MILLIONS

d'infections à VIH évitées d'ici à 2030


5,9 MILLIONS

d'infections parmi les enfants évitées d'ici à 2030


17 FOIS

le retour sur investissement pour le VIH


Nouvelles infections à VIH dans les pays à revenu faible ou intermédiaire (millions)



Décès liés au sida dans les pays à revenu faible ou intermédiaire (millions)



Nouvelles infections à VIH dans différents groupes de population, 2030



- Enfants
- Personnes hétérosexuelles (y compris jeunes femmes, à l'exclusion du commerce du sexe)
- Professionnelles du sexe et leurs clients
- Hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes
- Personnes qui s'injectent des drogues

L'approche d'accélération de l'ONUSIDA

Pour faire avancer la riposte au sida, l'ONUSIDA a élaboré une approche d'accélération pour atteindre un ensemble de cibles assorties de délais d'ici à 2020. Les cibles sont notamment : 90% de toutes les personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut VIH, 90% des personnes qui connaissent leur séropositivité au VIH ont accès au traitement, et 90% des personnes sous traitement ont une charge virale supprimée. Elles comprennent également la réduction des nouvelles infections à VIH de 75% et la réalisation de zéro discrimination.

Parmi les 36,9 millions de personnes vivant avec le VIH dans le monde, 17,1 millions ne savent pas qu'elles ont le virus et doivent être atteintes par les services de test VIH et environ 22 millions n'ont pas accès au traitement contre le VIH, notamment 1,8 million d'enfants.

Aux niveaux actuels, il y aura un écart de US\$ 9 milliards sur le plan mondial entre les ressources disponibles aujourd'hui et les ressources nécessaires pour atteindre les cibles d'accélération fixées par l'ONUSIDA. Le coût mondial annuel pour réaliser les cibles d'accélération atteindra un pic de US\$ 31,1 milliards en 2020. Après 2020, les besoins en ressources commenceront à diminuer.

Au cours des cinq prochaines années la riposte au sida exigera une accélération des investissements et un accroissement de la diversité des investissements, des mécanismes de prestation et des partenariats innovants pour faire en sorte que personne ne soit laissé pour compte, en particulier les adolescents, les jeunes et les populations clés.

L'approche d'accélération, associée à un programme de justice sociale qui donne la priorité aux citoyens et fait en sorte que leurs besoins en matière de santé sexuelle et reproductive et de droits soient entièrement respectés et satisfaits, sera impossible à arrêter.

Si le monde n'agit pas pour briser l'épidémie d'ici à 2020, elle pourrait rebondir et atteindre les niveaux d'il y a 10 ans.

Lieu-population

L'approche d'accélération peut être dirigée au niveau national, mais elle est réalisée à l'échelon local. L'accélération demande aux villes, aux villages et aux communautés de prendre en charge leurs ripostes au VIH en analysant la nature de leur épidémie et en utilisant ensuite une approche lieu-population pour concentrer leurs ressources sur des programmes de haut niveau, éclairés par des données probantes, dans les zones géographiques et parmi les populations qui en ont le plus besoin.

Il est important de faire ce qu'il faut au bon endroit, pour les bonnes personnes, et de la bonne manière.

Mettre fin à l'épidémie de sida d'ici à 2030 – la Stratégie 2016–2021 de l'ONUSIDA

Avec les ODD, le monde s'est engagé à mettre fin à l'épidémie de sida d'ici à 2030. Cet objectif ambitieux et pourtant totalement réalisable représente une occasion sans précédent de changer le cours de l'histoire à jamais.

La Stratégie 2016–2021 de l'ONUSIDA est l'une des premières au sein du système des Nations Unies à être alignée sur les ODD, qui fixent le cadre pour la politique mondiale de développement au cours des 15 années à venir, notamment mettre fin à l'épidémie de sida d'ici à 2030.

Il s'agit d'un moment passionnant dans la riposte au sida. Le monde crée une nouvelle dynamique en direction d'un avenir durable, équitable et sain pour tous.

36,9

millions de
personnes vivant
avec le VIH dans le
monde en 2014

22

millions de
personnes qui
doivent être
atteintes par
la thérapie
antirétrovirale

17,1

millions de
personnes vivant
avec le VIH ne
savent pas qu'elles
ont le virus

Stratégie 2016–2021 de l'ONUSIDA : cibles, objectifs, vision

CIBLES POUR 2020



Cible 1

90% of people (children, adolescents and adults) living with HIV know their status, 90% of people living with HIV who know their status are receiving treatment and 90% of people on treatment have suppressed viral loads



Cible 6

90% of key populations, including sex workers, men who have sex with men, people who inject drugs, transgender people and prisoners, as well as migrants, have access to HIV combination prevention services



Cible 2

Zero new HIV infections among children, and mothers are alive and well



Cible 9

Overall financial investments for the AIDS response in low- and middle-income countries reach at least US\$ 30 billion, with continued increase from the current levels of domestic public sources



Cible 7

90% of women and girls live free from gender inequality and gender-based violence to mitigate the risk and impact of HIV



Cible 3

90% of young people are empowered with the skills, knowledge and capability to protect themselves from HIV



Cible 10

75% des personnes vivant avec, exposées au risque de contracter le VIH et affectées par le VIH, qui sont dans le besoin, bénéficient d'une protection sociale prenant en compte le VIH



Cible 4

90% of women and men, especially young people and those in high-prevalence settings, have access to HIV combination prevention and sexual and reproductive health services



Cible 5

27 million additional men in high-prevalence settings are voluntarily medically circumcised, as part of integrated sexual and reproductive health services for men



Cible 8

90% of people living with, at risk of and affected by HIV report no discrimination, especially in health, education and workplace settings

Moins de 500 000 nouvelles infections à VIH

JALONS STRATÉGIQUES
POUR 2020

Moins de décès liés



PRINCIPAUX ODD
LIÉS AU SIDA
POUR 2030



ODD 3
Bonne santé et
bien-être

Mettre fin à l'épidémie
de sida

ZÉRO nouvelle
infection à VIH

ZÉRO discrimination

ZÉRO décès
lié au sida

**CIBLE DES ODD
RELATIVE AU SIDA
POUR 2030**



ODD 5
Égalité entre les sexes



ODD 16
Paix, justice et
institutions efficaces



ODD 10
Inégalités réduites



ODD 17
Partenariats pour
la réalisation
des objectifs

500 000
s au sida

Élimination de la
discrimination
liée au sida



Instantané de la situation dans les régions

Nouvelles infections à VIH

Afrique subsaharienne



En Afrique subsaharienne, on estime à 1,4 million le nombre des nouvelles infections à VIH en 2014. Une **chute de 41% depuis 2000**.

2000 2,3 millions [2,2 millions–2,4 millions]
2014 1,4 million [1,2 million–1,5 million]

Caraïbes



Dans les Caraïbes, le nombre des nouvelles **infections à VIH a baissé de moitié** entre 2000 et 2014.

2000 27 000 [21 000–31 000]
2014 13 000 [9600–17 000]

Moyen-Orient et Afrique du Nord



Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, on estime que le nombre des **personnes ayant contracté le VIH s'est accru de 26%** entre 2000 et 2014.

2000 18 000 [12 000–23 000]
2014 22 000 [13 000–33 000]

Amérique latine



En Amérique latine, le nombre des **nouvelles infections à VIH en 2014** était de **17% inférieur** à celui de 2000.

2000 100 000 [88 000–120 000]

2014 87 000 [70 000–100 000]

Europe occidentale et centrale et Amérique du Nord



Le nombre des nouvelles infections est resté relativement stable depuis 2000.

2000 87 000 [53 000–130 000]

2014 85 000 [48 000–130 000]

Europe orientale et Asie centrale



En Europe orientale et en Asie centrale, les nouvelles **infections à VIH ont augmenté de 30%** entre 2000 et 2014.

2000 100 000 [90 000–120 000]

2014 140 000 [110 000–160 000]

Asie et Pacifique



Les **infections à VIH ont diminué de 31%** en Asie et dans le Pacifique.

2000 500 000 [440 000–590 000]

2014 340 000 [240 000–480 000]

Instantané de la situation dans les régions

Décès liés au sida

Afrique subsaharienne



Selon les estimations, en 2014 il y a eu **moins de 34%** de décès liés au sida en Afrique subsaharienne qu'en 2000.

2000 1,2 million [1 million–1,5 million]
2014 790 000 [670 000–990 000]

Caraïbes



Entre 2000 et 2014, le nombre des décès liés au sida a **chuté de plus de la moitié**.

2000 18 000 [12 000–28 000]
2014 8800 [5700–13 000]

Moyen-Orient et Afrique du Nord



Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, le nombre estimé de **décès liés au sida a plus que triplé** entre 2000 et 2014.

2000 3 600 [1 600–7 100]
2014 12 000 [5300–24 000]

Amérique latine



Les décès liés au sida **ont diminué de 31%** en Amérique latine.

2000 60 000 [43 000–120 000]

2014 41 000 [30 000–82 000]

Europe occidentale et centrale et Amérique du Nord



De 2000 à 2014, les décès liés au sida **ont chuté de 12%**.

2000 29 000 [12 000–96 000]

2014 26 000 [11 000–86 000]

Europe orientale et Asie centrale



Le nombre des décès liés au sida dans la région a **plus que triplé** entre 2000 et 2014.

2000 20 000 [11 000–45 000]

2014 62 000 [34 000–140 000]

Asie et Pacifique



Le décès liés au sida **ont augmenté de 11%** en Asie et dans le Pacifique entre 2000 et 2014. Une tendance à la baisse a toutefois débuté en 2005, représentant une diminution totale de 30%.

2000 220 000 [130 000–510 000]

2014 240 000 [140 000–570 000]



20 Avenue Appia
CH-1211 Genève 27
Suisse

+41 22 791 36 66

unaids.org